

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД

ONCE-DAILY  
**NUPLAZID**<sup>®</sup>  
(pimavanserin) 34mg capsules

Здесь приведена важная информация о препарате НУПЛАЗИД (пимавансерин), и эта информация может со временем меняться, поэтому перечитывайте этот вкладыш всякий раз, когда приобретаете этот препарат. Эта информация не заменяет беседы с лечащим врачом о вашем состоянии или лечении.



## В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ НУПЛАЗИД?

НУПЛАЗИД — это рецептурный лекарственный препарат, применяемый для лечения галлюцинаций и бреда при психозах, вызванных болезнью Паркинсона. Эти немоторные симптомы возникают тогда, когда у человека с болезнью Паркинсона появляются галлюцинации (то есть он видит, слышит или ощущает то, чего не ощущают другие) и/или бред (верит в то, чего нет на самом деле).



## КАКУЮ САМУЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МНЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О ПРЕПАРАТЕ НУПЛАЗИД?

Такие лекарственные препараты, как НУПЛАЗИД, могут повышать риск летального исхода у людей пожилого возраста, у которых наблюдается потеря связи с реальностью (психоз), вызванная спутанностью сознания и потерей памяти (деменция). НУПЛАЗИД не утвержден для лечения пациентов с деменцией, страдающих психозом, если только их галлюцинации и бредовые идеи не связаны с болезнью Паркинсона.



## КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ НУПЛАЗИД?

**НУПЛАЗИД не следует принимать, если у вас** была аллергическая реакция на любой из компонентов препарата НУПЛАЗИД. Аллергические реакции включают сыпь, крапивницу, отек языка, рта, губ или лица, чувство стеснения в горле и одышку.

**НУПЛАЗИД не следует принимать при некоторых заболеваниях сердца**, которые приводят к изменению сердечного ритма. Обязательно обсудите со своим лечащим врачом этот возможный побочный эффект. Если вам кажется, что у вас изменился характер сердцебиения, позвоните своему лечащему врачу.



## О КАКИХ ЕЩЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПРЕПАРАТА НУПЛАЗИД МНЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ?

**Удлинение интервала QT:** НУПЛАЗИД может повышать вероятность изменения сердечного ритма. Риск этого нарушения выше при приеме НУПЛАЗИДА вместе с определенными другими препаратами, способными удлинять интервал QT. Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете или недавно принимали.

**Дополнительную важную информацию по безопасности см. на обороте страницы.**



## КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПРЕПАРАТОМ НУПЛАЗИД (пимавансерин)?

**Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете.** Другие лекарственные препараты могут влиять на действие НУПЛАЗИДА. Некоторые лекарственные препараты не следует принимать вместе с НУПЛАЗИДОМ. Ваш лечащий врач объяснит вам, можно ли принимать НУПЛАЗИДА вместе с другими лекарственными препаратами. Если вы уже принимаете НУПЛАЗИД, не начинайте и не прекращайте лечение какими-либо лекарственными препаратами, не посоветовавшись сначала с лечащим врачом.



## КАКОВЫ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НУПЛАЗИДА?

К **распространенным побочным эффектам** НУПЛАЗИДА относятся отечность ног или рук, тошнота, спутанность сознания, галлюцинации, запоры и нарушения походки. Это не все побочные эффекты, которые могут возникать при приеме НУПЛАЗИДА. За подробной информацией о данном лекарственном препарате обращайтесь к своему лечащему врачу или к фармацевту.



## МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ НУПЛАЗИД ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА?

НУПЛАЗИД можно принимать вместе с карбидопой/леводопой без необходимости изменения их дозы. Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете.



## КАК ПРИНИМАТЬ НУПЛАЗИД?

Рекомендованная доза препарата НУПЛАЗИД — одна капсула (34 мг) один раз в сутки перорально, независимо от приема пищи, приблизительно в одно и то же время каждый день или в соответствии с предписаниями лечащего врача.



## КАК ПОЛУЧИТЬ НУПЛАЗИД?

Если лечащий врач назначит вам НУПЛАЗИД, он может зарегистрировать вас в системе [Acadia Connect](https://www.acadiaconnect.com)®. Эта программа поддержки может помочь вам или вашим близким в вопросах получения страхового покрытия относительно НУПЛАЗИДА. Посетите веб-сайт [acadiaconnect.com](https://www.acadiaconnect.com), чтобы узнать больше.

### **Дополнительная важная информация по безопасности**

Безопасность и эффективность НУПЛАЗИДА при лечении пациентов младше 18 лет неизвестны.

Это неполная информация по безопасности. Полную информацию по безопасности см. в прилагаемой полной [Инструкции по применению](#), в том числе в **ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ в рамке**, или посетите сайт [NUPLAZID.com](https://www.nuplazid.com).

С любыми вопросами об этом лекарственном препарате или об этой информации обращайтесь к лечащему врачу.

Об отрицательных побочных эффектах при лечении рецептурными препаратами рекомендуется сообщать в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Посетите сайт [www.fda.gov/medwatch](https://www.fda.gov/medwatch) или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088. Вы также можете позвонить в компанию Acadia Pharmaceuticals Inc. по телефону 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).