

# ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД

ONCE-DAILY  
**NUPLAZID**<sup>®</sup>  
(pimavanserin) 34mg capsules

Здесь приведена важная информация о препарате NUPLAZID<sup>®</sup> (pimavanserin), и эта информация может со временем меняться, поэтому перечитывайте этот вкладыш всякий раз, когда приобретаете этот препарат. Эта информация не заменяет беседы с лечащим врачом о вашем состоянии и лечении.

**У пожилых людей, страдающих связанными с деменцией психозами, риск смерти повышен:**

- Такие лекарственные препараты как NUPLAZID могут повышать риск летального исхода у людей пожилого возраста, у которых наблюдается потеря связи с реальностью (психоз), вызванная спутанностью сознания и потерей памяти (деменция).
- NUPLAZID не утвержден для лечения таких психозов, если они не связаны с галлюцинациями и бредом, при психозах, вызванных болезнью Паркинсона.



## В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ NUPLAZID?

NUPLAZID — это рецептурный лекарственный препарат, применяемый для лечения галлюцинаций и бреда при психозах, вызванных болезнью Паркинсона. Эти симптомы не связаны с двигательными нарушениями. Они возникают тогда, когда у больного болезнью Паркинсона появляются галлюцинации (то есть он видит, слышит или ощущает то, чего не ощущают другие) и (или) бред (верит в то, чего нет на самом деле).



## КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ NUPLAZID?

Препарат NUPLAZID не следует принимать, если у вас была аллергическая реакция хотя бы на один из компонентов препарата. Аллергические реакции включают сыпь, крапивницу, отек языка, горла, губ или лица, чувство стеснения в горле и одышку.

Препарат NUPLAZID не следует принимать при некоторых нарушениях работы сердца, которые приводят к изменению сердечного ритма. Обязательно обсудите со своим лечащим врачом возможные побочные эффекты. Если вам кажется, что у вас изменился характер сердцебиения, позвоните своему лечащему врачу.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ NUPLAZID

NUPLAZID повышает вероятность изменения сердечного ритма. Риск этого нарушения выше, если пациент принимает NUPLAZID вместе с некоторыми другими препаратами, способными удлинять интервал QT (на электрокардиограмме). **Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете или недавно принимали.**

**Дополнительную важную информацию по безопасности см. на обороте страницы.**



## КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С NUPLAZID?

**Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете.** Некоторые лекарственные препараты могут влиять на действие NUPLAZID. Некоторые лекарственные препараты не следует принимать вместе с NUPLAZID. Ваш лечащий врач объяснит вам, можно ли принимать NUPLAZID вместе с другими вашими лекарственными препаратами. Если вы уже принимаете NUPLAZID, не начинайте лечение новыми лекарственными препаратами и не прекращайте лечение прежними препаратами, не посоветовавшись вначале с лечащим врачом.



## ЧАСТЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ NUPLAZID

**Самые частые побочные эффекты** при лечении NUPLAZID — это отечность ног или рук, тошнота и спутанность сознания, галлюцинации, запоры и нарушения походки. Это не все побочные эффекты, которые могут возникать при лечении NUPLAZID. За подробной информацией о данном лекарственном препарате обращайтесь к своему лечащему врачу или к фармацевту.



## МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ NUPLAZID ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА?

NUPLAZID можно принимать вместе с карбидопой/леводопой. Менять дозы этих лекарственных препаратов не нужно. Рассказывайте лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете.



## КАК ПРИНИМАТЬ NUPLAZID?

Рекомендованная доза препарата NUPLAZID — одна капсула (34 мг) один раз в день перорально с едой или без еды, которая принимается приблизительно в одно и то же время каждый день или в соответствии с предписаниями вашего лечащего врача.



## КАК ПРИОБРЕСТИ NUPLAZID?

Если лечащий врач назначит вам NUPLAZID, то он может зарегистрировать вас в системе NUPLAZIDconnect™. Эта программа поддержки может помочь вам или вашим близким в вопросах получения страхового покрытия относительно NUPLAZID.

### **Дополнительная важная информация по безопасности**

Безопасность и эффективность NUPLAZID при лечении пациентов младше 18 лет неизвестны.

Это неполная информация по безопасности. Подробную информацию по безопасности см. в прилагаемом вкладыше Указания по применению, в том числе **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в рамке**, или посетите сайт NUPLAZID.com.

С вопросами об этом лекарственном препарате или об этой информации обращайтесь к своему лечащему врачу.

**Об отрицательных побочных эффектах при лечении рецептурными препаратами сообщайте в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Посетите сайт [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088. Вы также можете позвонить в компанию ACADIA Pharmaceuticals Inc. по телефону 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).**