

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA DOENTES E PRESTADORES DE CUIDADOS

ONCE-DAILY
NUPLAZID[®]
(pimavanserin) 34mg capsules

Leia esta informação importante antes de usar NUPLAZID[®] (pimavanserina) e sempre que aviar uma nova receita, porque a informação pode mudar. Esta informação não substitui a conversa com o seu profissional de saúde sobre a sua condição clínica ou tratamento.

Maior risco de morte em doentes idosos com psicose relacionada com doença:

- Os medicamentos como o NUPLAZID podem aumentar o risco de morte em pessoas idosas que tenham perdido noção da realidade (psicose) devido a confusão e perda de memória (demência).
- O NUPLAZID não está aprovado para o tratamento de doentes com psicose relacionada com demência não relacionada com alucinações e delírios associados à psicose da doença de Parkinson.



PARA QUE É USADO O NUPLAZID?

NUPLAZID (nu-PLA-zid) é um medicamento sujeito a receita médica usado para tratar alucinações e delírios associados à psicose da doença de Parkinson. Estes sintomas não motores ocorrem quando uma pessoa com a doença de Parkinson começa a ter alucinações (como ver, ouvir ou sentir coisas que não existem) e/ou delírios (como acreditar em coisas que não são verdadeiras).



QUEM NÃO DEVE TOMAR NUPLAZID?

Não tome NUPLAZID se tiver tido uma reação alérgica a qualquer um dos componentes no NUPLAZID. As reações alérgicas incluíram erupção cutânea, urticária, inchaço da língua, boca, lábios ou rosto, aperto na garganta e falta de ar.

Não tome NUPLAZID se tiver determinadas condições cardíacas que alterem o seu ritmo cardíaco. É importante conversar com o seu profissional de saúde sobre este possível efeito secundário. Contacte o seu profissional de saúde caso sinta alterações no seu batimento cardíaco.



QUE ALERTAS DEVEREI SABER SOBRE O NUPLAZID?

NUPLAZID pode aumentar o risco de alterações ao seu ritmo cardíaco. Este risco pode aumentar se o NUPLAZID for tomado com determinadas medicações capazes de prolongar o intervalo QT. **Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que tome ou que tenha tomado recentemente.**

Para Informação de Segurança Importante adicional, consulte o verso da página.



QUE OUTROS MEDICAMENTOS PODEM INTERAGIR COM O NUPLAZID?

Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que tome. Outros medicamentos podem afetar a forma como o NUPLAZID atua. Alguns medicamentos não devem ser tomados com NUPLAZID. O seu profissional de saúde pode dizer-lhe se é seguro tomar NUPLAZID com os seus outros medicamentos. Não inicie ou pare a toma de quaisquer medicamentos enquanto estiver a tomar NUPLAZID sem falar com o seu profissional de saúde primeiro.



QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS FREQUENTES DE NUPLAZID?

Os **efeitos secundários mais frequentes** de NUPLAZID incluem inchaço das pernas ou braços, náuseas, confusão, alucinação, obstipação e alterações à marcha normal. Estes não são todos os efeitos secundários possíveis de NUPLAZID. Para mais informação, pergunte ao seu profissional de saúde ou farmacêutico sobre esta doença.



POSSO TOMAR O NUPLAZID COM OUTROS MEDICAMENTOS DA DOENÇA DE PARKINSON?

Pode tomar NUPLAZID sem ajustamento das doses dos medicamentos de carbidopa/levodopa. Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que estiver a tomar.



COMO TOMO O NUPLAZID?

A dose recomendada de NUPLAZID é de uma cápsula de 34 mg, uma vez por dia, por via oral, com ou sem alimentos, tomada aproximadamente à mesma hora todos os dias ou conforme prescrito pelo seu profissional de saúde.



COMO OBTENHO O NUPLAZID?

Se o seu profissional de saúde lhe prescrever NUPLAZID, este pode inscrevê-lo em NUPLAZIDconnect™. Este programa de apoio pode ajudá-lo a si ou ao seu familiar com cobertura de seguro para o NUPLAZID.

Informação de Segurança Importante adicional

Não se sabe se o NUPLAZID é seguro e eficaz em pessoas com menos de 18 anos de idade.

Esta não é a informação de segurança completa. Para informação de segurança completa, leia a Informação de Prescrição anexa completa, incluindo o **Aviso na CAIXA DE TEXTO** ou consulte NUPLAZID.com.

Se tiver quaisquer questões sobre este medicamento ou informação, fale com o seu profissional de saúde.

É pedido que notifique efeitos secundários negativos de medicamentos sujeitos a receita médica à FDA. Consulte www.fda.gov/medwatch ou ligue para 1-800-FDA-1088. Pode também contactar a ACADIA Pharmaceuticals Inc. para 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).