

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PACIENTES Y CUIDADORES

ONCE-DAILY
NUPLAZID[®]
(pimavanserin) 34mg capsules

Lea esta información importante antes de usar NUPLAZID[®] (pimavanserin) y cada vez que reciba una reposición porque es posible que la información cambie. Esta información no reemplaza hablar con su proveedor de atención médica acerca de su afección médica o tratamiento.

Mayor riesgo de muerte en pacientes de edad avanzada con psicosis relacionada con la demencia:

- Los medicamentos como NUPLAZID pueden aumentar el riesgo de muerte en las personas de edad avanzada que han perdido contacto con la realidad (psicosis) debido a la confusión y la pérdida de memoria (demencia).
- El fármaco NUPLAZID no está aprobado para el tratamiento de pacientes con psicosis relacionada con demencia que no está relacionada con alucinaciones y delirios vinculados con la psicosis en la enfermedad de Parkinson.



¿PARA QUÉ SE USA NUPLAZID?

NUPLAZID (nu-pla-zid) es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar las alucinaciones y los delirios asociados con la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Estos síntomas no motores suceden cuando una persona con la enfermedad de Parkinson comienza a tener alucinaciones (tales como ver o escuchar cosas que no están presentes) y/o delirios (tales como creer en cosas que no son reales).



¿QUIÉNES NO DEBEN TOMAR NUPLAZID?

No tome NUPLAZID si ha tenido una reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes de NUPLAZID. Las reacciones alérgicas han incluido erupción, urticaria, inflamación de la lengua, la boca, los labios o la cara, opresión en la garganta y dificultad para respirar.

No tome NUPLAZID si tiene ciertas afecciones cardíacas que cambian el ritmo cardíaco. Es importante que hable con su proveedor de atención médica sobre este posible efecto secundario. Llame a su proveedor de atención médica si siente un cambio en los latidos cardíacos.



¿QUÉ ADVERTENCIAS DEBO TENER EN CUENTA SOBRE NUPLAZID?

Es posible que NUPLAZID aumente el riesgo de cambios en su ritmo cardíaco. Este riesgo puede ser mayor si NUPLAZID se toma con otros medicamentos conocidos por prolongar el intervalo QT. **Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o ha tomado recientemente.**

Consulte el dorso para obtener información importante adicional sobre la seguridad.



¿QUÉ OTROS MEDICAMENTOS PUEDEN INTERACTUAR CON NUPLAZID?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma. Otros medicamentos pueden afectar la manera en que NUPLAZID actúa. Algunos medicamentos no deben tomarse con NUPLAZID. Su proveedor de atención médica puede informarle si es seguro tomar NUPLAZID con sus otros medicamentos. No empiece ni interrumpa el uso de ningún medicamento mientras toma NUPLAZID sin antes hablar con su proveedor de atención médica.



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES DE NUPLAZID?

Los **efectos secundarios más frecuentes** de NUPLAZID incluyen inflamación de las piernas o los brazos, náuseas, confusión, alucinaciones, estreñimiento y cambios en la forma normal de caminar. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de NUPLAZID. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico acerca de este medicamento.



¿PUEDO TOMAR NUPLAZID CON OTROS MEDICAMENTOS PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON?

Puede tomar NUPLAZID sin modificar las dosis de los medicamentos de carbidopa/levodopa. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma.



¿CÓMO DEBO TOMAR NUPLAZID?

La dosis recomendada de NUPLAZID es una cápsula de 34 mg, una vez al día, por boca, con o sin alimentos; debe tomarla aproximadamente a la misma hora todos los días o según las indicaciones de su proveedor de atención médica.



¿CÓMO CONSIGO NUPLAZID?

Si su proveedor de atención médica le receta NUPLAZID, puede registrarlo a usted en NUPLAZIDconnect™. Este programa de apoyo puede ayudarlo a usted o a su ser querido con la cobertura de seguro de NUPLAZID.

Información importante adicional de seguridad

No se sabe si NUPLAZID es seguro y eficaz en personas menores de 18 años de edad.

Esta no es la información completa de seguridad. Para ver la información completa de seguridad, lea la información de prescripción completa que se encuentra adjunta, incluido el **Recuadro de advertencias** o visite NUPLAZID.com.

Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento o esta información, asegúrese de hablarlo con su proveedor de atención médica.

Se recomienda que notifique los efectos secundarios negativos de fármacos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede llamar a ACADIA Pharmaceuticals Inc. al 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).