

在使用 NUPLAZID<sup>®</sup> (pimavanserin) 以及每次續配藥物之前，均請閱讀本重要須知，因為資訊可能有所變更。請勿憑據本資訊而放棄為您的醫療病症或治療找您的醫護服務提供者看診。

## 患有失智症相關精神症狀的老年患者死亡風險較高：

- 因為意識混淆和記憶喪失（失智症）而與現實脫節（精神疾病）的老年患者若使用諸如 NUPLAZID 等藥物可能會加大死亡風險。
- NUPLAZID 未經核准用於治療與巴金森氏症精神疾病所引起之幻覺和妄想無關的失智症相關精神疾病患者。



## NUPLAZID 可用於治療哪些病況？

NUPLAZID (new-PLA-zid) 是用於治療與巴金森氏症精神疾病有關之幻覺和妄想的處方藥。當巴金森氏症患者開始出現幻覺（例如：看見、聽見或遇到了別人未看見、未聽見或未遇到的事物）和／或妄想（比如相信不真實的事情）時，便會發生這些非運動性症狀。



## 哪些人不應使用 NUPLAZID ？

若您曾對 NUPLAZID 的任何成分發生過敏反應，請勿使用 NUPLAZID。過敏反應包括皮疹；蕁麻疹；舌、口、唇、或臉腫脹；喉嚨發緊及呼吸急促。

若您患有會使心律改變的特定心臟疾病，切勿使用 NUPLAZID。切記要向您的醫護服務提供者洽詢此項可能的副作用。若您感覺心跳有異，請致電您的醫護服務提供者。



## 我應該知道哪些與 NUPLAZID 有關的警告事項？

NUPLAZID 可能會加大心律改變的風險。若將 NUPLAZID 和已知會導致 QT 間期延長的其他特定藥物一併使用，則可能會加大這一風險。請將您現用或近期曾用的所有藥物告知您的醫護服務提供者。



## 哪些藥物有可能與 NUPLAZID 發生交互作用？

請將您使用的所有藥物告知您的醫護服務提供者。其他藥物可能會影響 NUPLAZID 的作用。有些藥物不應與 NUPLAZID 一起服用。您的醫護服務提供者可以告訴您，NUPLAZID 與您的其他藥物一起使用安不安全。在服用 NUPLAZID 的期間，不要在未先向醫護服務提供者核實的情況下就啟用或停用任何藥物。



## NUPLAZID 有哪些常見的副作用？

NUPLAZID 最常見的副作用包括腿部或手臂腫脹，噁心、意識混淆、幻覺、便秘，以及正常的行走方式發生改變。以上並未列出 NUPLAZID 所有可能的副作用。如需更多與本藥物有關的資訊，請洽詢您的醫護服務提供者或藥劑師。



## NUPLAZID 能否與其他巴金森氏症藥物一起使用？

您在使用 NUPLAZID 時無須調整 carbidopa/levodopa 藥物的劑量。請將您正用的所有藥物告知您的醫護服務提供者。



## 如何服用 NUPLAZID ？

NUPLAZID 的建議劑量是每天口服一粒 34 mg 的膠囊，可隨食物也可不隨食物服用；在每天大約同一時間或按照您醫護服務提供者的處方服用。



## 我如何取得 NUPLAZID ？

若醫護服務提供者把 NUPLAZID 開給您，其可能會為您註冊 NUPLAZIDconnect™。此項支持計劃可協助您或您的親友取得 NUPLAZID 的保險承保。

### 其他重要安全須知

目前尚不知曉 NUPLAZID 對未滿 18 歲的患者是否安全有效。

這並非一份完整的安全須知。如需完整的安全資訊，請參閱隨附的完整處方資訊（包括方框內的警訊，或造訪 [NUPLAZID.com](http://NUPLAZID.com)。

若您對本藥物或本須知有任何疑問，務必與您的醫護服務提供者討論。

我們鼓勵您向美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 通報處方藥的不良副作用。請造訪 [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) 或致電 1-800-FDA-1088。您也可致電 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342) 聯絡 ACADIA Pharmaceuticals Inc.。