

本情報は重要であり変更の可能性もあるので、NUPLAZID[®]（ピマバンセリン）の使用を始める前およびお薬が補充されるたびに必ずお読みください。なお、本情報をお読みになったからといって、あなたの医学的状態や治療を担当医師にお話ししなくてもよくなるわけではありません。



NUPLAZID は何のために用いられるのですか？

NUPLAZID（ニュープラジッド）は、パーキンソン病による精神病に関連した幻覚や妄想の治療に用いられる処方薬です。パーキンソン病を持つ方に幻覚（現実にはない物を見たり物音を聞いたりする、など）かつ／または妄想（現実ではないことを信じる、など）が現れ始めた時に、これらの非運動性の症状が起こります。



NUPLAZID について知っておくべき最も重要な情報は何か？

NUPLAZID のようなお薬は、錯乱および記憶障害（認知症）により、現実との接点の喪失（精神病）が認められる高齢者において、死亡のリスクを増加させる可能性があります。NUPLAZID は、幻覚や妄想がパーキンソン病に関連している場合を除き、精神病が認められる、認知症を持つ患者さんを治療対象として承認されてはいません。



NUPLAZID を服用してはいけないのは誰ですか？

NUPLAZID に含有されるいずれかの成分に対するアレルギー反応がある場合には、**NUPLAZID を服用してはなりません。**アレルギー反応としては、発疹、じんましんのほか、舌、口腔、口唇または顔面の腫脹、ならびに息切れがあります。

心リズムを変化させる特定の心疾患がある場合には、**NUPLAZID を服用してはなりません。**このような潜在的な副作用について担当医師にお話しするのは重要なことです。心拍の変化をお感じになった場合には、担当医師にお電話ください。



他に NUPLAZID について知っておくべき注意事項は何でしょうか？

QT 間隔延長：NUPLAZID により、あなたの心拍が変化するリスクが高まる可能性があります。QT 間隔を延長させることがわかっている特定の他のお薬と一緒に NUPLAZID を服用した場合には、こうしたリスクが高まる可能性があります。現在服用しているかあるいは最近服用した薬はすべて医師にお知らせください。

重大な安全性情報について、詳しくは裏のページをご覧ください。



NUPLAZID® (ピマバンセリン) と相互作用を起こす可能性のある医薬品には何がありますか？

服用している薬はすべて担当医師にお知らせください。医薬品の中には NUPLAZID の作用に悪影響を与えうるものもあります。また、医薬品の中には、NUPLAZID と一緒に服用してはならないものもあります。担当医師は、あなたが用いている他の医薬品と一緒に NUPLAZID を服用することが安全かどうか、お話しすることができます。NUPLAZID の服用中、担当医師に事前に相談することなく医薬品の服用を開始したり中止したりしないよう、お願いいたします。



NUPLAZID のよく見られる副作用には何がありますか？

よく見られる NUPLAZID の副作用には、脚または腕の腫脹、悪心、錯乱、幻覚、便秘、および歩行障害などがあります。これらは、NUPLAZID の潜在的な副作用を網羅しているわけではありません。このお薬についての詳しい情報は、担当医師または薬剤師にお尋ねください。



NUPLAZID を他のパーキンソン病薬剤と一緒に服用してもかまいませんか？

カルビドパ/レボドパは、その用量を調節することなく NUPLAZID と一緒に服用することができます。服用している薬はすべて担当医師にお知らせください。



NUPLAZID の服用方法は？

NUPLAZID の推奨用量は、食事の有無にかかわらず、1日に1回、毎日のほぼ同じ時刻に 34 mg カプセルを1個、または担当医師の指示に従って、経口服用することです。



NUPLAZID の入手方法は？

NUPLAZID を処方された場合、担当医師はあなたを [Acadia Connect®](#) にサインアップすることができます。このサポートプログラムは、NUPLAZID への保険適用に関して、あなたやあなたのご家族にとって役立つ可能性があるものです。詳しくは [acadiaconnect.com](https://www.acadiaconnect.com) にアクセスしてご確認ください。

その他の重大な安全性情報

18歳未満の人々に対しては、NUPLAZID が安全で効き目があるかどうかわかっていません。

本情報は完全な安全性情報ではありません。完全な安全性情報については、同封した完全な処方箋（**枠組み警告**を含む）をお読みになるか、[NUPLAZID.com](https://www.nuplazid.com) をご覧ください。

このお薬または本情報について何かご質問がありましたら、担当医師と必ずお話ししてください。

FDA に対し処方薬の有害な副作用を報告することをお勧めします。 www.fda.gov/medwatch にアクセスするか、1-800-FDA-1088 までにお電話でご連絡ください。また、Acadia Pharmaceuticals Inc. [1-844-4ACADIA (1-844-422-2342)] にお電話でご連絡いただくこともできます。